



## HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 71 CMN DE TORREÓN

### Resumen clínico

Nombre: jevl  
Edad: 42 años  
Sexo: masc.

Masculino de 42 años de edad quien acude a la consulta de ORL en tercer nivel de atención por tumor submaxilar derecho en estudio. Originario y residente de Gómez Palacio, Durango, casado, chofer. Alérgico a sulfas y amikacina, hipoacusia súbita izquierda 3 años previos. Antecedente de resección de tumor submaxilar derecho hace 26 años con resultado patológico benigno, sin especificación de estirpe. Niega otros antecedentes quirúrgicos. Inicia padecimiento de 4 años con aumento de volumen en región submaxilar derecha, lentamente progresivo, acompañado inicialmente de dolor local a la palpación de la misma, posteriormente sin dolor a la manipulación.

A la exploración física. Consciente y orientado, cara simétrica al reposo, con pliegues frontales y surcos nasogenianos conservados, con movilidad facial y sensibilidad táctil conservadas. Otoscopía: conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, cono luminoso presente. Cavidad oral con adecuada apertura oral, piezas dentales completas, en regular estado de higiene, carrillos libres, lengua móvil en sus 2/3 distales, piso de la boca sin abombamientos, paladar óseo íntegro y simétrico, a la palpación bimanual aumento de volumen de consistencia renitente, no doloroso a nivel de región submaxilar derecha, sin gasto espontáneo ni a la compresión a través de desembocadura del conducto de Wharton bilateralmente. Cuello se encuentra asimétrico a expensas de aumento de volumen en región submandibular derecha de 5x4cm, no indurado, blando, móvil, renitente, sin cambios de coloración ni aumento de la temperatura local, tráquea se palpa central y móvil, sin otras masas ni megalias palpables, pulsos carotídeos sincrónicos. Laboratorios dentro de rangos de normalidad.

En tac simple y contrastado de cuello se observa imagen isodensa en región submaxilar derecha, homogénea, bien delimitada y con bordes definidos, de 50x30mm, adherido a glándula submaxilar derecha, sin realce al medio de contraste. Sin desplazamiento de vía aérea ni colecciones.

Se realiza resección de tumor, se identifica tumor adherido a glándula submaxilar derecha, de 3x6 cm de aspecto multilobulado, firme, blanquecino y vascularizado, enviando pieza a estudio histopatológico definitivo.

Idx: tumor submandibular derecho en estudio.

**Jefe de Servicio ORL UMAE 71 - Dr. Héctor Hernández Flores**  
**Médico de Base Titular del caso: Dra. Karla Deyanira Ayala Torres**  
**Residente segundo año - Dr. Jorge Eduardo Nava Villarreal**  
**Residente cuarto año - Dr. Omar Gregorio Hernández Pacheco**



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 71  
CMN DE TORREÓN

