



**SESIÓN INTERHOSPITALARIA
NOVIEMBRE 2020
HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN:

Paciente masculino de 51 años de edad, originario y residente de Culiacán, Sinaloa, soltero, empleado.

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:

Carga genética para diabetes mellitus tipo 2 por rama paterna

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:

Habita en vivienda tipo urbana que cuenta con todos los servicios. Zoonosis negada, esquema de vacunación completo. Adecuados hábitos dietéticos e higiénicos. Niega tabaquismo, toxicomanías y exposición a biomasa. Alcoholismo ocasional a razón de 10 cervezas cada 15 días. COMBE negativo.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:

Médicos: Diabetes mellitus tipo 2, desde hace 16 años, en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, acarbosa 50 mg cada 12 horas e insulina glargina 25 UI.

Quirúrgicos: Negados

Alérgicos: negados

Transfusionales: negados

Traumáticos: negados

PADECIMIENTO ACTUAL:

Inicia siete meses previos a su valoración con dolor localizado en hemicuello izquierdo, rápidamente progresivo que se extiende a región preauricular y cavidad oral ipsilateral de intensidad 7/10 EVA, se intensifica y magnifica con la deglución, toser y estornudar. La odinofagia se presenta con sólidos y líquidos sin limitar la ingesta. se acompaña con cefaleas holocraneanas, sin datos de focalización. Refiere múltiples tratamientos por particulares a razón de AINES y antibióticos sin mejoría.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Signos vitales: FC: 76 lpm, TA: 115/85 mmHg, FR: 16 rpm, T° 36.6°C IMC: 31.8

Paciente masculino de edad aparente igual a la cronológica, Glasgow 15 puntos, cooperador. Con adecuada coloración e hidratación de piel y tegumentos.

Oídos: Pabellones auriculares bien formados e implantados, otoscopia bilateral con conductos auditivos permeables, membranas timpánicas íntegras, aperladas, sin abombamientos, retracciones o niveles transmembrana, adecuada movilidad.

Nariz: Pirámide nasal central, dorso lineal, narinas permeables, rinoscopia anterior con mucosa con adecuada hidratación y coloración, cornetes inferiores en ciclo, septum lineal y funcional.

Cavidad oral: Mucosa adecuadamente hidratada. Sin limitación de la apertura bucal. Piso de boca y paladar duro sin alteraciones aparentes.