



Sesión Interhospitalaria SMORLCCC Marzo 2026

Presenta:

Dra. Célica Raquel González Galván R3 ORL / Dr. Uriel Rafael De la Rosa Rodríguez R2 ORL

Coordina:

Dr. Arturo Ivan González González MA ORL

Ficha de identificación:

Paciente masculino de 42 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, religión católica, estado civil: soltero, escolaridad: secundaria terminada, ocupación: desempleado, hemotipo desconocido.

Antecedentes heredofamiliares:

Madre con antecedente de cáncer de tiroides de stirpe no especificado.

Resto interrogados y negados.

Antecedentes personales no patológicos:

Habita en casa prestada, en zona urbana, cuenta con todos los servicios básicos de urbanización (agua, luz y drenaje), cohabita con 2 personas en 2 habitaciones. Refiere buenos hábitos higiénicos y malos hábitos dietéticos. Inmunizaciones: Sars-cov-2: 4 dosis, última aplicada en 2022, combe negado, exposición a biomasa negada, tabaquismo pasivo negado.

Antecedentes personales patológicos:

Atresia esofágica: Diagnosticada al mes de nacimiento, en medio público, manejado quirúrgicamente, sin complicaciones, actualmente sin seguimiento.

Toxicomanías, antecedentes crónico-degenerativos y alergias negadas.

Padecimiento actual:

Paciente inicia padecimiento actual en 2019 con aumento de volumen en hemicara izquierda, sin acudir a valoración médica. En 2020 se agrega hiperestesia y dolor en hemicara izquierda, acompañado de dificultad para la masticación de alimentos de consistencia sólida de carácter progresivo. En 2024 acude al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para valoración.

Exploración física:

Paciente masculino de edad aparente a la cronológica orientado, alerta y cooperador. Sin datos de dificultad respiratoria. Cráneo normocéfalo. Otoscopia bilateral con conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, sin abombamientos o retracciones. Cavidad oral con apertura limitada secundario a dolor, piezas dentales en regular estado de conservación, piso de la boca sin abombamientos. Región facial asimétrica a expensas de aumento de volumen en hemicara izquierda, desde la región malar hasta el borde de la mandíbula, en su límite medial a 1 centímetro de la comisura labial izquierda y en su límite lateral hasta región preauricular, con un volumen aproximado de 10 x 10 centímetros, de consistencia blanda, móvil y no adherida a planos profundos, bordes bien delimitados, dolorosa la palpación, que no condiciona cambios tróficos en la piel suprayacente. Cuello cilíndrico, sin adenomegalias o colecciones palpables.